



# GRANDES CULTURES

## FLASH' CULTURES

### MAÏS

Le temps chaud permet au maïs de poursuivre son développement à grande vitesse et de rattraper un peu plus le retard accumulé depuis les semis. Dans les parcelles exceptionnellement avancées (variétés précoces semées fin mars dans la Hardt), les maïs sont en floraison. Plus généralement, les premières panicules sont visibles dans les situations précoces et certains maïs ont à peine 80 cm dans les situations les plus tardives.

### Pyrale

Comme pour le maïs la poursuite du temps chaud permet une accélération du cycle de la pyrale. Les émergences des adultes sont en progression tous les jours (à l'exception de dimanche où la pluie a rafraîchi l'atmosphère). Nous ne sommes probablement pas encore au pic de vol, mais celui-ci pourrait être atteint dans les prochains jours en secteur précoce.

### MAÏS

- Pyrale

### BETTERAVES

- Cercosporiose
- Noctuelles

### L'ADAR des 2 Pays vous invite à

**une visite de l'essai désherbage du maïs**  
 (nouveaux produits, réduction de doses, intérêt des adjuvants...)

**le jeudi 8 juillet à 9 heures**

à l'entrée d'Obersoultzbach, sur la gauche en venant de Bouxwiller, le long de la D7. Accès fléché.

Renseignements au 03.88.70.72.33.

La ponte qui avait démarré la semaine dernière s'est intensifiée depuis le week-end dernier. Les premières pontes écloses ont été observées hier dans le Kochersberg, et des oeufs au stade tête noire ont été observés lundi dans le secteur de Wissembourg.

### Préconisations

**Trichogrammes** : les lâchers doivent être réalisés dans tous les secteurs de précocité.

**Traitement chimique** : la période idéale de positionnement des traitements contre la pyrale a débuté dans les secteurs précoces. Dans des secteurs intermédiaires (Kochersberg, Plaine, Ochsenfeld...) les traitements peuvent être envisagés dès la fin de la semaine. Dans les secteurs les plus tardifs, on pourra attendre la semaine prochaine.

## BETTERAVES

### Cercosporiose

On signale de nouveaux symptômes dans les secteurs du Sundgau, du Kochersberg, du Piémont, de Hochfelden et de Wissembourg. Avec le temps chaud, entrecoupé d'averses orageuses plus ou moins violentes, le risque reste important à ce jour.



## Préconisations

Dans ces nouveaux secteurs, les parcelles devront être protégées avec Priori Xtra ou Amistar Xtra à 1l/ha.

## Noctuelles

Des dégâts (feuilles trouées), ont été signalés la semaine dernière mais à de faibles intensités. Il s'agit principalement des zones fortement attaquées en 2009 (périphérie de Strasbourg et Hochfelden). Dans certaines parcelles, ces dégâts ont fortement progressé.

Le seuil d'intervention se situe à 50 % de feuillage présentant des perforations.

## Préconisations

Dans les parcelles où ce seuil est atteint ou dépassé, une intervention peut être envisagée avec une pyréthrine autorisée sur cet usage.

**BETTERAVES**

- Betteraves
- Célerettes
- Navettes